



Suleiman Agri Company



## فراشة ثمار العنب

### **فراشة العنب Lobesia botrana**

حشرة ضارة معروفة أيضا باسم دودة العنقود. فراشة العنب من أهم الحشرات الضارة بالعنب. ولها عدد من الأجيال بالعام الواحد.

تفصي فراشة العنب الشتاء تحت القشرة، على شكل خادرة. تظهر الحشرات البالغة عند بداية الربيع. تم التزاوج وضع البيوض، حيث توضع هذه البيوض منفردة على البراعم الزهرية والحراشف. تتراوح مدة التحضين من 7 إلى 15 يوم. بعد الفقس، تثقب اليرقة البرعم الزهري وتشكل عشها على البراعم الزهرية بواسطة خيط حريري. بعد عشرة أيام، تظهر الحشرات البالغة للجيل الثاني وتبدأ في الطيران. مدة طيران هذا الجيل قصيرة. تضع الإناث المخصبة بيوضها على الثمار المتواجدة في مرحلة حجم حبة الجلبة. مدة التحضين قصيرة نظراً للظروف المناخية الملائمة. تتغذى الديدان من محتوى الثمار بحفر أنفاق تحت غشاء الثمار.

**المكافحة:** تبدأ من ظهور الجيل الأول وتشكل الأعشاش وذلك باستخدام المبيد الحشري البيولوجي (بليثيرو) المعتمد عالمياً.

### **Belthirul WP بليثيرو**

**المادة الفعالة:** B.T - بيسيلس ثيرونجينس من نوع كيرستاكى 32%  
مبيد حشري بيولوجي يعمل عن طريق الهضم وهو على شكل مسحوق قابل للأذوبان في الماء. يستخدم للفضاء على الأطوار اليرقية للحشرات من رتبة حرشفية الأجنحة على مجموعة واسعة من الخضار والمحاصيل الحقلية والأشجار بأنواعها والكرمة.

#### المميزات:

- بقائية طويلة الأمد على النبات وبفاعلية متميزة .
- مرخص للاستخدام في الزراعات العضوية .
- معدل الاستخدام: من 0.5 - 1 كغ في الهاكتار

مثال للإستخدام في برامج المكافحة المتكاملة IPM  
بضمانة شركة بروبلتي - إسبانيا



لبنان - بيروت



+961 1 990 941/2



[sac.leb@sleiman-agri.com](mailto:sac.leb@sleiman-agri.com)



[Suleiman Agriculture Company](http://Suleiman Agriculture Company)



[Suleiman Agricultural Company LEB](#)